

1.Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз – пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

Верхньощелепної

Лобової

Клиноподібної

Решітчастої

Соскоподібних комірок

2.Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається затруднене носове дихання, підвищена температура, головні болі, слъзовиділення болючість при пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?

Sinus maxillaris dexter

Sinus frontalis dexter

Sinus shenoidalis dexter

Cellulae ethmoidales anteriores

Cellulae ethmoidales posteriors

3.Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворення можливе поширення інфекції?

Canalis infraorbitalis

Canalis pterigoideus

Canalis nasolacrimalis

Canalis incisivus

Fissura orbitalis inferior

4.Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає контрфорси верхньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

4

6

3

5

2

5.У хворого травматолог діагностував перелом кістки ділянці іклової ямки. На якій кістці розташована дана ямка?

Верхня щелепа

Нижня щелепа

Лобова кістка

Піднебінна кістка
Вилична кістка

6. У пацієнта після екстракція 7 верхнього зуба в лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи найімовірніше пошкоджена у цьому разі?

Гайморової пазухи
Клиноподібної пазухи
Середні комірки решітчастої пазухи
Задні комірки решітчастої пазухи
Лобової пазухи

7. Машина швидкої медичної допомоги доставила в лікарню чоловіка з черепно-мозковою травмою. Після рентгенологічного дослідження лікар встановив перелом кістки черепа. Лінія перелому проходить через вінцевий відросток. Яка кістка травмована?

Нижня щелепа
Верхня щелепа
Лобова
Піднебінна
Вилична

8. У потерпілого з вогнепальним пораненням куля пройшла крізь кістку черепа біля підборідного отвору. Яка кістка пошкоджена?

Нижня щелепа
Верхня щелепа
Лобова
Піднебінна
Вилична

9. На рентгенограмі діагностовано перелом кістки, лінія перелому проходить вздовж щелепно-під'язикової лінії. Яка кістка пошкоджена?

Нижня щелепа
Сконева
Верхня щелепа
Тім'яна
Потилична

10. У хворого ускладнення нежиті. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі зліва. У який носовий хід виділяється гній?

У лівий середній носовий хід
У правий нижній носовий хід
У правий верхній носовий хід
У правий загальний носовий хід
У правий носоглотковий хід

11. При обстеженні пацієнта в відділенні щелепно-лицевої хірургії, лікар вивчає контрфорси нижньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

- 2
- 1
- 3
- 4
- 5

12. У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?

Вивих нижньої щелепи

Стрес

Перелом нижньої щелепи

Параліч жувальних м'язів

Ураження рухового центру мови

13. У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи ("заяча губа"). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

Незрощення лобового і верхньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

Незрощення другої зябрової дуги

Незрощення третьої зябрової дуги

Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

14. Лікаря-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку з ротової порожнини. В ділянці якого анатомічного утвору потрібно робити ін'єкцію?

Великого піднебінного отвору

Піднижньоочноямкового отвору

Різцевого каналу

Нижньощелепного отвору

Підборідного отвору

15. У дитини встановлена вроджена ущелина верхньої губи ("заяча губа") та переднього відділу неба ("вовча паща"). Незрощення яких відростків викликаний цей дефект?

Носового, піднебінного

Верхньощелепного, лобного

Піднебінного, нижньощелепного

Нижньощелепного, носового

Носового, лобного

16. У хворого гайморитом порушено сполучення верхньощелепної пазухи з середнім носовим ходом. Яке утворення в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

Hiatus semilunaris

Infundibulum ethmoidale

Foramina ethmoidalia

Recessus sphenopalatinus

Canalis nasolacrimalis

17. У хірургічне відділення доставлено чоловіка, 22 років, з вогнепальним пораненням голови. Встановлено ушкодження шийки нижньої щелепи (collum mandibulae). Який відросток нижньої щелепи ушкоджений?

Виростковий відросток (processus condylaris).

Вінцевий відросток (processus coronoideus).

Верхня підборідна ость (spina mentalis superior).

Язичок нижньої щелепи (lingula mandibulae).

Нижня підборідна ость (spina mentalis inferior)

18. 3 місяці спортивних змагань у лікарню доставлений чоловік з травмою обличчя. Лікар встановив перелом кістки лицевого черепа. Лінія перелому проходить через підчорнячковий край (margo infraorbitalis). Яка кістка травмована?

Верхня щелепа (maxilla).

Сльозова кістка (os lacrimale).

Носова кістка (os nasale).

Нижня щелепа (mandibula).

Піднебінна кістка (os palatinum)

19. Лікар з метою знеболювання великих кутніх зубів зробив ін'єкцію анестетика (знеболюючої речовини) до утвору верхньої щелепи, що є місцем входу нервів з підскроневої ямки через foramina alveolaria до задніх зубних комірок. Де лікар зробив ін'єкцію анестетика?

Tuber maxillae

Sinus maxillaris.

Processus frontalis.

Processus palatinus.

Processus alveolaris

20. У дитини травмована нижня губа. Який м'яз при цьому ушкоджений?

M. orbicularis oris

M. levator labii superioris

M. buccinator

M. risorius

M. levator anguli oris

21. Під час стану емоційного напруження у людини з'явилися поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м'яза відбулося?

M. occipitofrontalis

M. temporoparietalis

M. procerus

M. auricularis anterior

M. corrugator supercilii

22. Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м'язів вірогідно буде страждати?

M. masseter

M. orbicularis oris

M. buccinator

M. procerus

M. risorius

23. Хворий не може підняти опущену вниз нижню щелепу. Які м'язи не можуть виконати свою функцію?

Жувальні

Мімічні

Коловий м'яз рота

Надчерепний

М'яз- підіймач кута рота

24. Хворий скаржиться на неможливість бічних рухів нижньої щелепи. Який з м'язів найвірогідніше ушкоджено?

M. pterygoideus lateralis

M. pterygoideus medialis

M. buccinators

M. masseter

M. risorius

25. Нормальну оклюзію зубних дуг можна посилити, відтягнувши нижню щелепу назад. Який м'яз виконує цю функцію?

Скроневий

Медіальний крилоподібний

Латеральний крилоподібний

Жувальний

Груднинно-ключично-соскоподібний

26. Хворого госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?

Щелепно-під'язиковий
Щито-під'язиковий
Шило-под'язиковий
Лопатково-під'язиковий
Груднинно-під'язиковий

27. Вивчаючи жувальні м'язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:

Зовнішній крилоподібний м'яз
Внутрішній крилоподібний м'яз
Жувальний м'яз
Передні пучки скроневого м'яза
Середні пучки скроневого м'яза

28. Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м'яз:

Скроневий
Жувальний
Бічний крилоподібний
Присередній крилоподібний
Двочеревцевий

29. У травмованого правобічний перелом вінцевого відростка нижньої щелепи із зміщенням. Який м'яз змістить відросток?

Скроневий
Медіальний крилоподібний
Латеральний крилоподібний
Жувальний
Напружувач м'якого піднебіння (м'яз-натягувач піднебінної завіски)

30. Хвора скаржиться на болі при жуванні, особливо при русі нижньої щелепи назад. Які м'язи вражені?

Задні пучки скроневих
Передні пучки скроневих
Медіальні крилоподібні
Латеральні крилоподібні
Жувальні

31. У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порушенням функції яких м'язів це викликано?

Виличний м'яз
М'язи, що опускають кут рота
М'язи, що піднімають верхню губу і крило носа
М'язи сміху

Коловий м'яз рота

32. При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини. Пошкодження якого м'яза можна запідозрити?

M. orbicularis oculi

M. procerus

M. orbicularis oris

M. corrugator supercilii

M. depressor supercilii

33. У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мимічних м'язів порушена?

m. orbicularis oculi

m. procerus

m. corrugator supercilii

m. occipitofrontalis [venter frontalis]

m. zygomaticus major

34. При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м'язу може бути причиною вказаної патології?

Підборідно-під'язикового

Жувального

Скроневого

Медіального крилоподібного

Латерального крилоподібного

35. При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглобу. Який це м'яз?

M. pterygoideus lateralis

M. masseter

M. pterygoideus medialis

M. temporalis

M. mylohyoideus

36. При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м'яз. Який?

Щічний

Великий виличний м'яз

Жувальний

Коловий м'яз рота

Щелепно – під'язиковий м'яз

37. У юнака 18 років після вуличної бійки травмована бічна ділянка лиця. При огляді лікар встановив, що шкіра травмована, рана відкрита, гілка нижньої щелепи зламана, з жувальних м'язів залишився цілим тільки той, що не піднімає щелепу. Який це м'яз?

Бічний крилоподібний

Передні пучки скроневого

Середні пучки скроневого

Жувальний

Присередній крилоподібний

38. Хворий, 25 років, отримав травму скронево-нижньощелепного суглоба. Який м'яз прикріплюється до суглобового диска?

M. pterygoideus lateralis

M. temporalis

M. pterygoideus medialis

M. zygomaticus minor

M. zygomaticus major

39. У хворого, 45 років, виявлено запалення піднижньощелепної слинної залози. В якому трикутнику шиї знаходиться ця залоза?

Trigonum submandibulare

Trigonum submentale

Trigonum caroticum

Trigonum omoclaviculare

Trigonum omotrapezoideum.

40. Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі та перелом скронево-нижньощелепного суглобу. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Скронева кістка та нижня щелепа

Клиновидна кістка та нижня щелепа

Лобна та носові кістки

Скронева кістка та верхня щелепа

Вилична кістка та слізна кістка

41. Хворого оперують з приводу травми скронево-нижньощелепного суглоба. Під час розсічення виявлена структура, що доповнює конгруентність суглобових поверхонь. Що це за структура?

Диск

Губа

Складка

Зв'язка

Меніск

42.Пацієнт звернувся до лікаря з приводу вивиху головки нижньої щелепи. До якого виду сполучення кісток належить даний суглоб?

- Діартроз
- Синхондроз
- Геміартроз
- Синостоз
- Синдесмоз

43.Травматолог кладе свої великі пальці обернуті марлею на жувальні поверхні нижніх молярів хворого, другими пальцями захоплює нижній край нижньої щелепи та сильно тягне її до низу, а підборіддя у цей час повертає вверх. Далі щелепа відводиться назад. Що лікує травматолог?

- Вивих нижньої щелепи
- Перелом основи нижньої щелепи
- Перелом тіла нижньої щелепи
- Артроз скронево-нижньощелепного суглоба
- Запалення ясен

44.Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно звести її донизу. Яка анатомічна структура обумовлює таку дію?

- Суглобовий горбок скроневої кістки
- Нижньощелепна ямка скроневої кістки
- Виростковий відросток нижньої щелепи
- Вінцевий відросток нижньої щелепи
- Вирізка нижньої щелепи

45.До стоматолога звернувся чоловік зі скаргами на біль в ділянці скронево-нижньощелепного суглоба, що виникає під час жування. Після обстеження лікар встановив запалення утвору скроневої кістки, що розташований спереду від нижньощелепної ямки і під основою виличного відростка. Який утвір скроневої кістки уражений запальним процесом?

- Суглобовий горбок
- Соскоподібний відросток
-
- Шилоподібний відросток
- Дугове підвищення

46.У чоловіка встановлено вивих нижньої щелепи. Де знаходяться головки нижньої щелепи при її вивиху?

- Попереду від суглобового горбка
- Зліва від суглобового горбка
- Позаду від суглобового горбка
- Справа від суглобового горбка
- Зверху від суглобового горбка

47. У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Укажіть клітини, ушкодження яких може призвести до втрати нюху:

- Нейросенсорні клітини
- Підтримувальні епітеліоцити
- Базальні епітеліоцити
- Мікроворсинчасті епітеліоцити
- Війчасті епітеліоцити

48. При обстеженні хворої дитини лікар виявив часткову відсутність сосочків на бічній поверхні язика. Які це сосочки?

- Листоподібні
- Ниткоподібні
- Грибоподібні
- Конічні
- Жолобуваті

49. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

- Гірке
- Солодке
- Солоне
- Усіх смакових відчуттів
- Кисле

50. Під час лікування зубів лікар стоматолог поміщає ватний тампон у присінок між щогою та альвеолярним відростком верхньої щелепи. Вивідний отвір протоки якої залози закриває цей тампон?

- Привушної
- Губних
- Язикових
- Піднижньощелепної
- Під'язикової

51. У пацієнта порушена больова та температурна чутливість язика. Які сосочки уражені?

- Ниткоподібні, конічні
- Листоподібні, грибоподібні
- Жолобуваті, ниткоподібні
- Конічні, жолобуваті
- Грибоподібні, ниткоподібні

52. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

Вовча паща.

Викривлення носової перегородки вправо.

Перелом основи черепа.

Заяча губа.

Викривлення носової перегородки вліво.

53. При огляді порожнини рота лікар виявив невелику виразку на передній лівій піднебінній дужці? На який м'яз розповсюдиться запальний процес?

M. palatoglossus

M. styloglossus

M. palatopharyngeus

M. genioglossus

M. hyoglossus

54. Вагітна жінка отримала підвищену дозу випромінювання. У результаті цього порушився процес внутрішньоутробного розвитку плода. При формуванні порожнини рота не відбулося зрощення піднебінних відростків верхньої щелепи. Виникнення якої аномалії передбачається?

Вовча паща.

Атрезія стравоходу.

Мікротомія.

Макростомія.

Заяча губа.

55. До лікаря звернулася мати немовляти зі скаргами, що під час першого годування молоко почало витікати з носової порожнини. Яка аномалія розвитку у немовляти?

Незрощення твердого піднебіння.

Заяча губа.

Атрезія стравоходу.

Атрезія анального отвору.

Стравохідно-трахейний свищ.

56. При вивченні гістологічного препарату в слизовій оболонці ротової порожнини визначені сальні залози. З якого відділу отримано препарат?

Шовна зона щоки

Спинка язика

Слизова частина губи
Шовна зона твердого піднебіння
Дно порожнини рота

57. У хворого 25 років у ділянці правої щоки свіжа подовжня різана рана завдовжки до 4 см. і глибиною 1 см., яка сильно кровоточить. На які анатомічні структури потрібно звернути особливу увагу при накладанні швів?

Гілки лицьового нерва.
Верхньощелепну артерію.
Гілки верхньощелепного нерва.
Нижньощелепну артерію.
Протоку привушної залози.

58. Хворий 35 років, звернувся до приймального відділення зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. Після огляду, діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної залози. Куди відкривається ця протока?

Під'язикове м'ясце.
Присінок порожнини рота.
Сліпий отвір язика.
Ясеневу кишеню.
Власне порожнина рота.

59. Пацієнтка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога через набряк під правим оком. Після обстеження встановлено діагноз: флегмона підочномкової ділянки. Від яких зубів інфекція найчастіше поширюється в цю ділянку обличчя?

Верхнього ікла й першого премоляра
Верхніх бічних та присередніх різців
Верхнього присереднього різця
Верхніх першого та другого молярів
Другого премоляра та першого моляра

60. Стоматолог при огляді ротової порожнини дитини виявив коротку вуздечку верхньої губи. На які зуби впливає ця аномалія розвитку?

Медіальні верхні різці;
Медіальні нижні різці;
Латеральні верхні різці;
Латеральні нижні різці;
Верхні ікла.

61. Мати звернулася до педіатра. Хвора дівчинка 6 міс. з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота. Який зуб прорізується?

Присередній нижній різець;
Бічний нижній різець;
Присередній верхній різець;
Бічний верхній різець;
Нижній кутній зуб.

62.Мати звернулася по допомогу до педіатра. Хворий хлопчик 12 міс. з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота. Який зуб прорізується?

Нижній перший великий кутній зуб;
Присередній нижній різець;
Ікло;
Малий кутній зуб;
Нижній другий великий кутній зуб;

63.При огляді дівчинки 18 міс. лікар відмітив припухлість ясен. Дівчинка з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота іграшки. Який зуб прорізується в цьому віці?

Нижнє ікло;
Присередній нижній різець;
Верхнє ікло;
Нижній другий великий кутній зуб;
Малий кутній зуб.

64.При огляді ротової порожнини стоматолог виявив, що у дитини з'явилися перші великі нижні корінні зуби. Який вік дитини?

6- 7 років.
5-6 років.
8-9 років.
10-11 років.
12-13 років.

65.Дитині 13-ти років видалили другий молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

Другий малий кутній зуб
Другий великий кутній зуб
Третій великий кутній зуб
Перший малий кутній зуб
Перший великий кутній зуб

66. У потерпілого травмована верхня щелепа - вибитий перший малий корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджено?

Альвеолярний

Виличний

Очноямковий

Піднебінний

Лобовий

67. На поверхні коронки другого великого кутнього зуба, яка контактує з щогою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

Facies vestibularis

Facies mesialis

Facies lingualis

Facies distalis

Facies occlusalis

68. У хворого при огляді порожнини рота встановлено різке почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

Язиковий мигдалик

Піднебінна завіска

Глотковий мигдалик

Трубний мигдалик

Піднебінний мигдалик

69. У постраждалого з травмою основи черепа встановлене пошкодження гачкоподібного відростка присередньої пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Функція якого м'яза м'якого піднебіння буде порушена?

Напрягача піднебінної завіски

Піднебінно-язикового

Піднебінно-глоткового

М'яза язичка

Підіймача піднебінної завіски

70. Після перенесеного гострого паротиту, чоловіку 40 років, необхідно провести аналіз показників її секрету. В якому місці на щоці лікар може провести забір слини з вічка протоки привушної слинної залози?

На рівні 2 верхнього великого кутнього зуба.

На рівні 1 верхнього великого кутнього зуба.

На рівні 2 нижнього великого кутнього зуба.
На рівні 3 верхнього великого кутнього зуба.
На рівні 2 верхнього малого кутнього зуба.

71.Хворому 25 років, для уточнення діагнозу необхідно зробити сіалографію привушної слинної залози. Куди відкривається вічко протоки привушної залози, через яке буде введена рентгеноконтрастна маса?

В присінок рота напроти II-го верхнього великого кутнього зуба на вершині сосочка протоки привушної залози.

В ділянці щоки напроти II-го нижнього великого кутнього зуба.

В ділянці щоки напроти верхнього II-го малого кутнього зуба.

На *caruncula sublingualis*.

На *plica sublingualis*.

72.У стоматологічну поліклініку звернувся хворий з запаленням комірки коміркового відростка верхньої щелепи. Яка тканина зуба постраждає при цьому захворюванні у першу чергу?

Цемент.

Дентин.

Емаль.

Пульпа зуба.

Коронка зуба.

73.Відомо, що у 50% випадків корінь одного з зубів роздвоєний на верхівці. Який зуб людини має таку характерну особливість?

Другий верхній малий кутній зуб.

Перший нижній малий кутній зуб

Другий нижній малий кутній зуб.

Перший верхній великий кутній зуб

Перший верхній малий кутній зуб.

74.При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини:

10-12 місяців

6-7 місяців

7-8 місяців

12-15 місяців

16-20 місяців

75.При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх присередніх різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:

6-7 місяців

8-9 місяців

10-12 місяців

13-14 місяців

19-20 місяців

76. У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений?

Перший верхній премоляр

Перший нижній премоляр

Ікло

Другий верхній премоляр

Другий нижній премоляр

77. У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб найбільш вірогідно уражений?

Верхній медіальний різець

Верхнє ікло

Верхній латеральний різець

Верхній перший премоляр

Верхній перший моляр

78. Видаливши зуб у пацієнта, стоматолог побачив, що він має два корені. Що це за зуб?

Нижній великий кутній

Ікло

Верхній великий кутній

Нижній малий кутній

Верхній різець

79. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

Біпрогнатія

Закритий прикус

Прогенія

Ортогнатія

Прямий прикус

80. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

Прямий прикус

Біпрогнатія

Прогенія

Закритий прикус

Ортогнатія

81. При огляді ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?

Facies lingualis

Facies contactus

Facies distalis

Facies mesialis

Facies vestibularis

82. У маленької дівчини 5 років лікар видалив зуб на якому було два корені. Який це зуб?

Великий кутній нижньої щелепи

Ікло верхньої щелепи

Малий кутній нижньої щелепи

Малий кутній верхньої щелепи

Великий кутній верхньої щелепи

83. Мати з дитиною 2-х років звернулась до педіатра. Яка кількість молочних зубів має бути у цієї дитини?

20

16

18

10

8

84. Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все буде відбуватися?

Порожнина рота, ротоглотки

Порожнина рота та гортаноглотки

Глотки, шлунку

Глотки та стравоходу

Стравоходу та шлунку

85. При огляді хворого виявлено, що при висовуванні язика, його верхівка відхиляється убік. Функція якою м'язи язика при цьому порушена?

Підборідно-язикового

Під'язикового

Верхнього поздовжнього

Нижнього поздовжнього

Шило-язикового

86. У новонародженої дитини педіатр помітив, що вуздечка язика простягається до самого кінчика. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

Анкілоглосія
Макроглосія
Мікроглосія
Аплазія

-

87. Під час огляду ротової порожнини дитини, 6 років, встановлено защемлення країв язика. Які сосочки лежать по краях язика?

Foliatae.

Fungiformes.

Vallatae.

Filiformes.

Conicae.

88. У пацієнта, якому видалено другий великий кутній зуб нижньої щелепи, спостерігається коміркова кровотеча. Яка артерія є джерелом кровотечі?

Верхньощелепна

Висхідна глоткова

Очна

Язикова

Лицева

89. Потерпілому 37 років була нанесена травма гострим предметом в нижню ділянку сонного трикутника ший. Яка судина при цьому була пошкоджена?

Загальна сонна артерія

Зовнішня сонна артерія

Зовнішня яремна вена

Верхня щитоподібна артерія

Внутрішня сонна артерія

90. Хворий страждає на параліч очних м'язів, різний діаметр зіниць, біль за ходом трійчастого нерва. Про аневризму (розширення) якого венозного синуса можна думати?

Sinus cavernosus

Sinus transversus

Sinus sagittalis superior

Sinus petrosus superior

Sinus occipitalis

91. У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень, вірогідно, ушкоджено?

Sinus sagittalis superior

Sinus petrosus superior

Sinus rectus
Sinus sagittalis inferior
Sinus transversus

92.Потерпілий доставлений у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало місце?

Нижньої коміркової артерії
Висхідної глоткової артерії
Язикової артерії
Висхідної піднебінної артерії
Верхньої коміркової артерії

93.У хворого Л. 27 років з остеомієлітом нижньої щелепи в патологічний процес втягнута вена, яка проходить в каналі нижньої щелепи. В результаті запалення у хворого виник набряк обличчя в ділянці нижньої щелепи. Яка вена вражена?

V. alveolaris inferior
V. submentalialis
V. lingualis
V. labialis inferior
V. sphenopalatina

94.У хворого кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія ймовірно всього пошкоджена?

Лицева
Верхньощелепна
Язикова
Поверхнева скронева
Кутова

95.Учень першого класу отримав травму обличчя у спортивному залі. Виникла кровотеча з нижньої губи. Гілки якої артерії ушкоджені?

A. facialis
A. lingualis
A. maxillaris
A. infraorbitalis
A. alveolaris superior

96.У пацієнтів перелом нижньої щелепи призвів до кровотечі з a. alveolaris inferior. Гілка якої артерії пошкоджена?

A. maxillaris
A. carotis externa
A. carotis interna
A. facialis

A. mentalis

97. Чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на біль у горлі. Під час обстеження пацієнта виявлено гіпертрофію лімфоїдного органу, який знаходиться в fossa tonsillaris. Укажіть цей орган.

Tonsilla palatina

Tonsilla lingualis

Tonsilla pharyngea

Tonsilla adenoidea

Tonsilla tubaria

98. У пацієнта при епідемічному енцефаліті спостерігаються одно - або двобічний птоз (опущення повік), розбіжна косоокість, порушення акомодациї. Зіниці розширені. Ядра якої пари черепних нервів уражені?

III

IV

V

VI

VII

99. У хворого запалення верхньощелепного нерва. Через який отвір основної кістки цей нерв виходить з порожнини черепа?

Круглий

Овальний

Яремний

Венозний

Остистий

100. У постраждалого лівобічний перелом верхньощелепної кістки із втратою шкірної чутливості над нею. Яке анатомічне утворення пошкоджено?

Мала гусяча лапка

Щелепно-лицьовий нерв

Лицьовий нерв

Нижньоочномковий нерв

Щічний нерв

101. При ковтанні їжі хворий відчуває ускладнення, що пов'язані з паралічем м'якого піднебіння. Який нерв пошкоджено?

III гілка трійчастого нерва

Лицьовий нерв

I гілка трійчастого нерва

II гілка трійчастого нерва

Під'язиковий нерв

102. До лікаря звернувся хворий зі скаргою на неможливість щільного зімкнення щелеп при жуванні. Лікар встановив атрофію жувальних м'язів, розміщених нижче виличної дуги. Гілки якого черепного нерва іннервують зазначену групу м'язів?

N. trigeminus (III гілка)

N. vagus

N. ophthalmicus

N. glossopharyngeus

N. facialis

103. У хворого спостерігається біль і відчуття оніміння в слизовій оболонці ясен верхньої щелепи. Які з нервів можуть бути пошкоджені?

Nn. alveolaris superiores (n. maxillaries)

N. facialis

N. glossopharyngeus

N. vagus

N. ophthalmicus

104. У постраждалого правосторонній перелом і крововилив в ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмовано?

Підборідний нерв

Верхні альвеолярні нерви

Щічний нерв

Нижній альвеолярний нерв

Щелепно-під'язикові нерви

105. Які з названих нервів можуть ушкоджуватися при гаймориті і оперативних втручаннях на гайморовій порожнині?

Nn. alveolares superiores

N. mandibularis

N. facialis

N. oculomotorius

N. lingualis

106. Хворий із запаленням слизової оболонки язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва це спричинено?

Язикового

Барабанного

Барабанної струни

Блукаючого

Лицевого

107. При первинному обстеженні у хворого встановлено відсутність чутливості передніх 2/3 язика. Смакову чутливість збережено. Який нерв уражений?

Язикова гілка трійчастого нерва до її з'єднання з барабанною струною

Під'язиковий нерв

Барабанна струна лицьового нерва

Язикова гілка трійчастого нерва після її з'єднання з барабанною струною

Язикоглотковий нерв

108. Хвора відчуває нападоподібні болі в ділянці лоба, в очному яблуці, у внутрішньому куті очної ямки. Натискання в медіальній частині надочнямкового краю болюче, порушена шкірна чутливість. Який нерв уражений?

Очний

Верхньощелепний

Блоковий

Відвідний

Окоруховий

109. 54-річний чоловік скаржиться на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, зовнішньої латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить з черепа ця гілка?

Підочнямковий отвір

Рваний отвір

Верхню очноямкову щілину

Остистий отвір

Овальний отвір

110. У чоловіка, 60 років, вікова далекозорість у зв'язку з ослабленням властивостей акомодатції кришталика і гладких м'язів судинної оболонки очного яблука, яке вимагає корекції лінзами. Гілками якого вузла іннервуються м'язи corpus ciliare?

G. ciliare

G. oticum

G. pterygopalatinum

G. trigeminale

G. sympathicus

111. У хворого невралгія війкового вузла (синдром Шарлена) - герпетичний висип на шкірі лоба, ознаки ураження склери, радужної оболонки, болі в ділянці очей з іррадіацією в ніс, болючість в ділянці внутрішнього кута ока. Гілки якого нерва утворюють чутливий корінець g. ciliare?

N. ciliaris longus

N. infraorbitalis

N. ethmoidalis anterior
N. ethmoidalis posterior
N. supraorbitalis

112. Лікар ввів у підочномковий отвір розчин анестетика. Які нерви знеболюються при цьому?

Підочномковий і передні верхні альвеолярні гілки
Відвідний
Окоруховий нерв
Блоковий нерв
Нижньощелепний нерв

113. У чоловіка з цукровим діабетом періодично виникають запалення сальних залоз верхньої повіки (Glandulae sebaceae (Zeis)) з пошкодженням повік, що викликає у хворого біль, свербіння. Який нерв іннервує шкіру верхньої повіки?

N. ophthalmicus
N. oculomotorius
N. abducens
N. trochlearis
N. infraorbitalis

114. У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробі виконати активне скорочення м'язів обличчя. Про ураження якого нерва повинен думати лікар?

Лицевого, його рухових волокон
Трійчастого 1-ої гілки (очний)
Трійчастого 2-ої гілки (верхньощелепний)
Трійчастого 3-ої гілки (нижньощелепний)
Під'язикового

115. Унаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою 2/3 язика і слюзотеча. Подразнення якого нерва це викликано?

Лицевого
Блукаючого
Під'язикового
Нижньощелепного
Барабанної струни.

116. Який нерв уражений, якщо у хворого права носо-губна складка згладжена, розширена права очномкова щілина (її не можна заплющити під час примруження, тому що повіки не змикаються), виникають ускладнення під час розмови і їжі (їжа застряє між щогою і зубами)?

N. facialis dexter

N. vagus dexter
N. abducens dexter
N. glossopharyngeus sinister
N. trigeminus dexter

117. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад сприйняття смаку в передній частині язика. Який нерв постраждав?

N. facialis
N. trigeminus
N. vagus
N. vestibulo-cochlearis
N. glossopharyngeus

118. При розтині глибокого абсцесу щоки було проведено вертикальний розріз, після чого спостерігається порушення функції м'язів на місці операції. Гілки якого нерва були перерізані?

Лицевого
Нижньощелепного
Під'язикового
Блукаючого
Верхньощелепного

119. Хворий скаржиться на сухість у роті, зменшення виділення слини. Які нерви пошкоджені?

Парасимпатичні волокна барабанної струни
Рухові волокна під'язикового нерва
Чутливі волокна язикового нерва
Парасимпатичні волокна блукаючого нерва
Симпатичні волокна симпатичного стовбура

120. У хворого після перенесеного грипу спостерігається маскоподібне обличчя: кут рота опущений, носо-губна складка згладжена, нижня повіка опущена. Який з нервів пошкоджений?

Лицевий
Верхньощелепний
Нижньощелепний
Великий кам'янистий
Очний

121. У боксера після удару в привушну ділянку зліва виник параліч мимічних м'язів на цьому ж боці. Який нерв пошкоджено?

Лицевий
Малий кам'янистий нерв
Очний
Верхньощелепний

Нижньощелепний

122. Під час прийому до клініки, обстежуючи хворого, виявлено, що у нього порушені смакові рецептори, що сприймають гірке, порушена тактильна чутливість задньої 1/3 язика. Який нерв залучено у патологічний процес?

Язикоглотковий

Під'язиковий

Язиковий.

Лицевий

Трійчастий

123. До клініки звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?

IX

X

VII

V

VI

124. У хворого спостерігається порушення функції привушної слинної залози. Який нерв підсилює її секрецію?

N. petrosus minor

N. auricularis major

N. petrosus major

N. petrosus profundus

N. auricularis minor

125. Хворий скаржиться на біль в ділянці кореня язика і піднебінних мигдаликів. Який нерв іннервує ці ділянки?

Язикоглотковий нерв

Під'язиковий

Додатковий нерв

Трійчастий

Блоковий

126. Виконуючи неврологічне обстеження пацієнта, 22 роки, лікар попросив його відкрити рот і вимовити звук «Аааа», при цьому оцінював, чи симетрично піднімається м'яке піднебіння. Потім лікар доторкнувся ватним тампоном до м'якого піднебіння і у відповідь виник блювотний рефлекс, що супроводжувався рухом піднебіння та глотки. Які черепні нерви досліджував лікар?

9 і 10

10, 11 і 12

5, 7 і 9

7, 8 і 9

127. У хворого при висуненні язика спостерігається відхилення його верхівки вправо. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?

N. hypoglossus dexter

N. glossopharyngeus dexter

N. vagus dexter

N. trigeminus sinister

N. facialis sinister

128. Хворий із зусиллями вимовляє слова, а також скаржиться на ускладнення при ковтанні. Пошкодження якого нерва викликало таку клінічну картину?

N. hypoglossus

N. vagus

N. facialis

N. glossopharyngeus

N. accessorius

129. У процесі стоматологічних маніпуляцій пошкоджені волокна 12 пари черепних нервів зліва. У чому це виявилось?

Порушення скорочення м'язів язика зліва

Порушення скорочення м'язів м'якого піднебіння

Порушення скорочення м'язів гортані

Порушення скорочення м'язів, що піднімають під'язикову кістку

Порушення скорочення м'язів глотки

130. У хворого посилена секреція привушної слинної залози. З подразненням якого ядра можна це пов'язати?

Nucleus salivatorius inferior

Nucleus solitarius

Nucleus salivatorius superior

Nucleus ambiguus

Nucleus dorsalis n. vagi

131. Стоматолог встановив, що хворий, 23 роки, скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

Ganglion submandibulare

Ganglion oticum

Ganglion pterigopalatinum

Ganglion ciliare

Ganglion sublinguale

132. У хворого при обстеженні виявлено зміну секреторної функції привушної залози, що пов'язано з патологією нерва, що несе від вушного вузла до залози післявузлові парасимпатичні волокна. Який це нерв?

N. auriculotemporalis

N. facialis

N. lingualis

N. buccalis

N. petrosus major

133. При огляді плода спостерігається розщеплення верхньої губи. Поставте діагноз вродженої вади обличчя:

Хейлосхізис

Палатосхізис

Макростомія

Мікрогнатія

Гіпертелорізм

134. Під час огляду плода виявлено розщеплення твердого піднебіння. Встановіть імовірний діагноз вродженої вади обличчя.

Палатосхізис

Хейлосхізис

Макростомія

Мікрогнатія

Гіпертелорізм

135. Під час дослідження видаленого зуба пацієнта виявлено: зуб має довгий корінь, на м'язовій поверхні - серединний валик, який розширювався до ріжучого краю зуба. Який зуб, найімовірніше, видалений у пацієнта?

Ікло верхньої щелепи

Великий кутній зуб верхньої щелепи

Присередній різець верхньої щелепи

Премоляр верхньої щелепи

Бічний різець нижньої щелепи

136. Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини руйнування якого каналу скроневої кістки можливе в цьому разі?

Лицевого

Барабанного

Канальця барабанної струни

М'язово-трубного

Сонного

137. У пацієнта діагностовано: ураження ядра під'язикового нерва. Який відділ головного мозку уражений патологічним процесом?

Довгастий мозок
Мозочок
Середній мозок
Проміжний мозок
Міст

138.Пацієнт звернувся до лікарні з травмою щоки та скаргами на неможливість зімкнути щелепи на боці поранення та висунути нижню щелепу вперед. Який м'яз ймовірно, пошкоджено у пацієнта?

Жувальний
Скроневий
Щічний
Присередній крилоподібний
Бічний крилоподібний

139.Хворий, 43років, звернувся зі скаргою на пухлину на корені язика. Хірург стоматолог виявив, що це злоякісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев'язати артерію, що проходить в трикутнику Пирогова. Це:

a. lingualis
a. palatina ascendens
a. profunda linguae
a. sublingualis
a. suprahyoideum

140.У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м'яза. Яку судину потрібно перев'язати?

A.facialis
A.maxillaris
Aa.labiales inferiores
A.mentalis
A.lingualis

141.Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньощелепній слинній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. facialis
A. submentalis
A. alveolarisinferior
A. labialisinferior
A. lingualis

142.До хірурга стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці під нижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м'якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

- A. palatina ascendens
- A. palatina descendens
- A. pharyngea ascendens
- A. facialis
- A. sphenopalatina

143. При видаленні ліпоми у хворого біля крила носу хірург-стоматолог пошкодив судину, що привело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена?

- A. facialis
- A. supraorbitalis
- A. maxillaris
- A. infraorbitalis
- A. angularis

144. У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

- Лицевої
- Передньої верхньої коміркової
- Підчонамкової
- Верхньощелепної
- Язикової

145. На будівництві робітник пошкодив бокову поверхню шийї справа в результаті удару балкою при її падінні. Під час надання допомоги у потерпілого виявилось зниження чутливості шкіри на передньо-бічній поверхні шийї праворуч. Який нерв постраждав у даному випадку?

- N. transversus colli
- N. vagus
- N. phrenicus
- N. accessorius
- N. trigeminus

146. У хворого на хронічне захворювання печінки був відзначений позитивний френікус-симптом. До якого м'яза притискають діафрагмовий нерв для перевірки цього симптому?

- Переднього драбинчастого м'яза
- Середнього драбинчастого м'яза
- Підключичного м'яза
- Заднього драбинчастого м'яза
- Груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

147. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на втрату чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу, що з'явилася після порізу

шкіри над груднинно-ключично-соскоподібним м'язом. Пошкодження якого нерва дало таку клінічну картину?

N. auricularis magnus

N. transversus colli

N. occipitalis minor

N. supraclaviculares

N. phrenicus

148. Під час операції при доступі до правої підключичної артерії з'явилося ускладнення у вигляді порушення дихання. Пошкодження якої структури обумовило вказане явище?

Діафрагмовий нерв

Зірчастий вузол

Спинномозковий нерв

Додатковий нерв

Під'язиковий нерв

149. Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з'явилися після незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення якого нерва йдеться?

Діафрагмового нерва

Підлопаткового нерва

Надключичних нервів

Надлопаткового нерва

Поперечного нерва шиї

150. У жінки, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?

Пахвового нерва

Підлопаткового нерва

Дорсального нерва лопатки

Підключичного нерва

Грудо-спинного нерва

151. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?

N. medianus

N. musculocutaneus

N. ulnaris

N. cutaneus antebrachii medialis

N. radialis

152. У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій м'язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні руки. Який нерв пошкоджено?

Променевий

Ліктьовий

Серединний

М'язово-шкірний

Пахвовий

153. При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість бічної поверхні передпліччя. Який нерв було ушкоджено при оперативному втручанні?

N.musculocutaneus

N.radialis

N.ulnaris

N.medianus

N.axillaris

154. Під час обстеження легень лікар ввів хворому бронхоскоп в один зі часткових бронхів і виявив, що він поділяється на два сегментарних бронха. У якій частці легень лікар проводив маніпуляцію?

У середній частці правої легені

У верхній частці правої легені

У нижній частці правої легені

У верхній частці лівої легені

У нижній частці лівої легені

155. У хірургічне відділення поступив потерпілий з проникаючим пораненням передньої черевної стінки. Раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Через яке утворення очеревини пройшов рановий канал?

Ligamentum hepatogastricum

Ligamentum gastrocolicum

Ligamentum hepatoduododenale

Ligamentum hepatorenale

Ligamentum triangulare sinistrum

156. У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка

М'ясисту оболонку

Внутрішню сім'яну фасцію

М'яз-підіймач яєчка

Зовнішню сім'яну фасцію

157.Сечокам'яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні сечоводу, вірогідніше всього, він може зупинитися?

На межі черевної та тазової частин

В місці

В середній черевній частині

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

На 5 см вище тазової частини

158.Хворий скаржиться на часте та затруднене сечовипускання. Який внутрішній статевий орган є причиною цього?

Простата

Яєчко

Цибулинно-сечівникові залози

Над'яєчко

Сім'яні пухирці

159.При гострому деструктивному панкреатиті проводять ревізію чепцевої сумки, оскільки підшлункова залоза утворює одну з її стінок. Яку саме?

Задню

Передню

Верхню

Нижню

Ліву

160.Хворій 30 р. лікар поставив діагноз нецукровий діабет. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

Гіпофізу

Щитоподібної

Статевих

Надниркових

Епіфіза

161.У хворого 60 років внаслідок злоякісної пухлини великого сосочка дванадцятипалої кишки виникла обтураційна жовтяниця. Просвіт якої анатомічної структури стискується пухлиною?

Печінково-підшлункова ампула

Міхурова протока

Загальна печінкова протока

Права печінкова протока

Ліва печінкова протока

162.Пацієнту з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї найчастіше знаходиться перешийок щитоподібної залози?

II-IV

I-II

IV-V

VI-VIII

V-VI

163.З яких частин складається шлунок?

Тіло, дно шлунка, пілорична та кардіальна частини

Дно, склепіння шлунка, пілорична частина, воротарна та кардіальна частини

Дно шлунка, велика та мала кривина, кардіальна частина

Тіло, дно, велика та мала кривина шлунка

Передня та задня стінки, пілорична та кардіальна частини

164.Хворий 45 років переніс тяжке порушення мозкового кровообігу. Після стабілізації загального стану, спостерігається втрата можливості чітко вимовляти слова. Ураження якої звивини кори головного мозку викликало порушення мовно-рухового центру?

Frontalis inferior

Angularis

Supramarginalis

Precentralis

Temporalis superior

165.Після крововиливу в мозок (геморагічний інсульт) хворий з великим зусиллям став вимовляти слова, тобто виникла моторна афазія. Яка звивина мозку при цьому ушкоджена?

Нижня лобова

Верхня лобова

Середня лобова

Верхня скронева

Нижня скронева

166.У хворого 68 років після інсульту (крововилив в головний мозок) спостерігається відсутність вольових рухів м'язів тулуба справа. Додаткове обстеження за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться зліва в задній ніжці внутрішньої капсули поруч з коліном. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

Tr. cortico-spinalis

Tr. cortico-nuclearis

Tr. thalamo-corticalis

Tr. cortico-thalamicus

Tr. cortico-fronto-pontinus

167.Хворий 63 років звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може виконувати столярні роботи, які потребують точності виконання, тому що права рука робить багато мимовільних рухів. При дослідженні виявлено, що у хворого пошкоджена:

Gyrus supramarginalis

Gyrus precentralis

Gyrus postcentralis

Gyrus temporalis superior

Gyrus angularis

168.Хворий втратив здатність читати (алексія). У якій частині головного мозку ураження?

Кутова звивина тім'яної частки великого мозку

Середня лобова звивина лобової частки великого мозку

Зацентральна звивина тім'яної частки великого мозку

Передцентральна звивина лобової частки великого мозку

Верхня скронева звивина скроневої частки великого мозку

169.Хворий після порушення кровопостачання головного мозку втратив здатність до написання літер і цифр. В якій частці мозку виникла патологія?

Lobus frontalis

Lobus occipitalis

Lobus temporalis

Lobus parietalis

Insula

170.Хворий не може розмовляти, але розуміє звернену до нього мову. Про ушкодження якої зі структур головного мозку йде мова?

Gyrus frontalis inferior

Gyrus frontalis superior

Gyrus precentralis

Gyrus postcentralis

Gyrus temporalis superior

171.У хворого спостерігається параліч м'язів верхньої і нижньої кінцівок лівої. Яка зі звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

Передцентральна

Середня лобова

Нижня лобова

Верхня лобова

Зацентральна

172.Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка зі звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

Верхня скронева

Нижня лобова

Зацентральна

Верхня тім'яна часточка

Нижня тім'яна часточка

173.Після травми у хворого спостерігається порушення моторних центрів, що регулюють діяльність м'язів голови. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр?

Нижня частина передцентральної звивини

Верхня частина передцентральної звивини

Надкрайова звивина

Верхня тім'яна часточка

Кутова звивина

174.У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?

Задня центральна звивина

Потилична ділянка

Поясна звивина

Лобова ділянка кори

Передня центральна звивина

175.У жінки виявлене порушення з боку дотикової чутливості. Яка ділянка мозку ушкоджена?

Задня центральна звивина кори

Довгастий мозок

Мозочок

Передня центральна звивина кори

Скронева ділянка кори

176.Хвора М., 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою тіла. Об'єктивно виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

Spatium subarachnoideum

Spatium subdurale

Spatium epidurale

Cavum trigeminale

Cisterna cerebellomedullaris posterior

177. У хворої М., 62 р., в ділянці gyrus angularis утворилася гематома. Хвора не може читати і розуміти написане (алексія), але зорова функція не порушена. Ядро якого аналізатора було пошкоджено?

Ядро зорового аналізатора письмової мови

Ядро рухового аналізатора письмової мови

Ядро слухового аналізатора усної мови

Ядро зорового аналізатора

Ядро рухового аналізатора усної мови

178. У хворого стався крововилив в потиличну ділянку, в зоні острогової борозни. Які функції організму при цьому постраждали?

Відсутній зір

Відсутній слух

Відсутній нюх

Відсутні рухи

Відсутня чутливість

179. У чоловіка 35 років з перенесеним менінгоенцефалітом відмічається різке зниження слуху. Обстеження виключає патологію звукопровідного та звукосприймаючого апаратів органа слуху. В якій звивині кори великого мозку патологічні зміни?

Верхній скроневій

Середній скроневій

Верхній лобовий

Надкрайовий

Кутовий

180. Хворий, який три місяці тому отримав травму голови, чує мову, розуміє її, але не може правильно назвати предмет. В якій звивині кори великих півкуль є ушкодження?

Нижня лобова

Верхня лобова

Верхня скронева

Середня лобова

Середня скронева

181. У хворого 50 років виявлено таламічний синдром, проявами якого є інтенсивний біль половини тіла, своєрідне положення руки ("таламічна рука"), гіперкінетичні розлади. Іноді до цих проявів приєднуються розлад нюху, насильницький сміх та плач. Яка частина мозку функціонально пошкоджена?

Thalamus

Metathalamus

Epithalamus

Hypothalamus

Mesencephalon

182. У дитини після грипу протягом 3 тижнів спостерігаються порушення терморегуляції у вигляді довготривалого субфебрилітету та гіпертермічних кризів. Лікар підозрює функціональну недостатність вищого вегетативного центра. Яка частина мозку функціонально пошкоджена?

Hypothalamus

Thalamus

Metathalamus

Epithalamus

Mesencephalon

183. У хворої діагностовано хорею. При цьому захворюванні має місце поява супровідних і вимушених рухів. Які структури головного мозку при цьому задіяні?

Substantia nigra et corpus striatum

Pulvinar thalamicus

Fasciculus longitudinalis medialis

Fasciculus longitudinalis posterior

Nucleus ruber

184. У нейрохірургічне відділення потрапив хворий, який отримав виробничу травму. При обстеженні виявлено, що металевий цвях пробив луску скроневої кістки і проник у речовину лівої скроневої частини ближче до скроневого полюсу. Яке з базальних ядер ушкоджено?

Мигдалеподібне тіло

Сочевицеподібне ядро

Хвостате ядро

Огорожа

Бліда куля

185. Хворий звернувся зі скаргами на порушення зору, пов'язане з опущенням повіки, неможливістю повернути око вгору і всередину. При огляді у хворого відмічено, що око відведене назовні, зіниця розширена і не реагує на світло, хворий не бачить на близькій відстані. Який нерв пошкоджено?

Окоруховий

Блоковий

Відвідний

Зоровий

Трійчастий

186. У результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки постраждалий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися вгору. Який нерв імовірно пошкоджений?

R.superior n.oculomotorius

N.trochlealis
R.inferior oculomotorius
N.abducens
N.opthalmicus

187.Дитина, 3 роки, потрапила до клініки з діагнозом: розбіжна косоокість. Ураженням яких нервів вона викликана?

Окорухових
Зорових
Блокових
Відвідних
Очних

188.Пацієнт звернувся до окуліста зі скаргами на опущення верхньої повіки. При обстеженні було діагностовано пухлину головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражене патологічним процесом?

III пари ЧМН
VII пари ЧМН
II пари ЧМН
IV пари ЧМН
VI пари ЧМН

189.У пацієнта при епідемічному енцефаліті спостерігаються одно - або двобічний птоз (опущення повік), розбіжна косоокість, порушення акомодатії. Зіниці розширені. Ядра якої пари черепних нервів уражені?

III
IV
V
VI
VII

190.Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавою блювотою. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірно в даному випадку?

Стравохідних
Верхньої брижової
Печінкових
Ворітної печінкової
Селезінкової

191.Під час профілактичного огляду в учня виявили незарощення боталової протоки. Які судини вона з'єднує?

Аорту і легеневий стовбур
Аорту і нижню порожнисту вену
Аорту і верхню порожнисту вену

Легеневу артерію і верхню порожнисту вену
Легеневу артерію і нижню порожнисту вену

192. Хворому поставили діагноз: ІХС, поширений інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. У басейні якої артерії порушений кровообіг?

Задньої міжшлуночкової гілки правої вінцевої артерії

Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

Огинальної гілки лівої вінцевої артерії

Осердно-діафрагмової артерії

Задньої гілки лівого шлуночка

193. У хворого діагностовано передньоверхівковий інфаркт, який є наслідком тромбозу однієї із судин серця. Якої?

Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

Задньої міжшлуночкової гілки правої вінцевої артерії

Огинальної гілки лівої вінцевої артерії

Осердно-діафрагмової артерії

Задньої артерії лівого шлуночка

194. Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряк та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

Велика підшкірна вена

Мала підшкірна вена

Стегнова вена

Підколінна вена

Великогомілкова вена

195. Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровопостачання:

Глибока артерія стегна

Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

Низхідна колінна артерія

Поверхнева надчеревна артерія

Глибока зовнішня соромітна артерія

196. Студентка 17 років видавила гнійник у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція потрапила в цю пазуху?

Через v. angularis

Через v. maxillaris

Через v. profunda faciei

Через v. transversa faciei

Через v. diploicae frontalis

197. Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

V. emissariae mastoideae

Vv. labyrinthi

Vv. tympanicae

V. facialis

Vv. auriculares

198. У лікарню госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом – геморагічний інсульт в ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії найбільш ймовірно призвело до цього стану?

A. cerebri anterior

A. communicans posterior

A. communicans anterior

A. cerebri posterior

A. cerebri media

199. У хворого порушена функція серцево-судинного та дихального центрів. В басейні яких артерій порушений кровотік?

Aa. vertebrales et basilaris

Aa. cerebri anterior et communicans anterior

Aa. cerebri anterior et cerebri media

Aa. communicans posterior et cerebri media

Aa. communicans posterior et cerebri posterior

200. Після травми стегна у пацієнта спостерігається розлад шкірної чутливості на передній поверхні стегна і медіальній поверхні гомілки, абсолютно неможливо енергійне розгинання ноги в колінному суглобі. Пошкодження якого нерва можна припустити?

Стегнового

Затульного

Сідничного

Верхнього сідничного

Нижнього сідничного

201. Після операції на шлунку у хворого виявлено ускладнення: уповільнилася перистальтика і секреція залоз і послабився воротарний сфінктер. Який нерв був пошкоджений при операції?

Блукаючий нерв

Додатковий нерв

Язикоглотковий

Трійчастий

Блоковый